

Dental Emergencies

Toothache

Rinse the mouth with warm water to clean it out. Place a cold compress or ice wrapped in a cloth on the outside of the cheek. Call and go to the dentist as soon as possible. Do NOT use heat or place aspirin on the tooth or gum tissue.

Broken Tooth

Rinse the mouth with warm water to clean the area. Place a cold compress on the face to reduce swelling. Call and go to the dentist as soon as possible. If possible, bring the broken tooth fragment with you to the dentist.

Knocked-Out Tooth

If it is a baby tooth, call the dentist as soon as possible. Do NOT attempt to put a baby tooth back in the socket.

If it is a permanent tooth, rinse it gently in cool water. Do NOT scrub it or clean it with soap.

If possible, put the tooth back in the socket and hold it there with clean gauze or a wash cloth.

If the tooth cannot be put back in the socket, place the tooth in a clean glass with milk, saliva, or water. Take the tooth and go to the dentist immediately.

Bitten Lip or Tongue

Clean the area gently with a cloth and apply direct pressure to the bleeding area. If swelling is present, apply a cold compress. If bleeding does not stop, go to a hospital emergency room immediately.



Know what to do if a painful dental emergency occurs with you or your child.

Objects Wedged Between Teeth

Try to remove the object with dental floss, guiding the floss carefully to avoid cutting the gums. If using floss does not work, call the dentist. Do NOT try to remove the object with a sharp or pointed object.

Possible Fractured Jaw

Apply a cold compress to control swelling. Go immediately to the emergency room of a local hospital. Head injuries can be life threatening.

Emergencias dentales

Dolor de dientes

Enjuague la boca con agua tibia para limpiarla. En la parte exterior de la mejilla coloque una compresa fría o hielo envuelto en un paño. Llame y acuda al dentista lo antes posible. NO use calor ni ponga una aspirina en el diente o en el tejido de la encía.

Diente roto

Enjuague la boca con agua tibia para limpiar el área. Coloque una compresa fría en la cara para reducir la inflamación. Llame y acuda al dentista lo antes posible. Si le es posible, lleve el fragmento del diente al dentista.


Pérdida de un diente por un golpe

Si el diente es de un bebé, llame a su dentista lo antes posible. NO intente volver a poner el diente del bebé en su cavidad.

Si es un diente permanente, lávelo suavemente con agua fría. NO lo frote ni lo lave con jabón. Si es posible, vuelva a poner el diente en su cavidad y manténgalo en su sitio con una gasa o paño limpio. Si no es posible volver a poner el diente en su cavidad, colóquelo en un vaso limpio con leche, saliva o agua. Tome el diente y vaya al dentista de inmediato.

Mordida en el labio o la lengua

Limpie el área con suavidad usando un paño y aplique presión directa al área que sangra. Si hay inflamación, aplique una compresa fría. Si el sangrado no se detiene, diríjase a una sala de emergencias de inmediato.



Sepa cómo actuar en caso de que usted o su hijo tengan una emergencia dental dolorosa.

Objetos atrapados entre los dientes

Trate de quitar el objeto con hilo dental, guiando el hilo con cuidado para evitar cortar las encías. Si no funciona el hilo dental, llame al dentista. NO intente quitar el objeto con un objeto filoso o puntiagudo.

Posible fractura de la mandíbula

Aplique una compresa fría para controlar la inflamación. Vaya de inmediato a la sala de emergencia de un hospital local. Las lesiones en la cabeza pueden ser potencialmente mortales.